

# 9岁及以下孩童遇车祸 八成未用安全椅

彭慧灵 报道 pangwl@sph.com.sg

●24小时新闻热线: 1800-8227288/91918727

WhatsApp/WeChat传照片: 91918727

遭遇车祸的9岁及以下儿童中，高达80%未使用安全座椅，多方呼吁加强这方面的意识，帮助家长采取更好的防范措施。

竹脚妇幼医院与国立大学医院旗下的国大创伤中心，今天举办第二届全国创伤预防大会，并公布相关数据。

数据显示，本地每年有超过2万7000名儿童受伤，约250例与交通事故相关。

新加坡保健集团总裁伍伟豪教授在会上分享真实案例。有未使用安全座椅的婴儿在车祸中遭受严重创伤性脑损伤需长期住院，而另一名正确使用安全座椅的婴儿，则在同类事故中毫发无伤，安全返家。

他强调，安全座椅在事故中可有效发挥保护作用，将受伤风险降低超过80%。

国立大学创伤中心中心主任、客座助理教授拉吉·梅农（Dr Raj Menon）则指出，儿童是道路交通事故中最脆弱的群体之一，但在各年龄层中遵守安全措施的比例却最低，许多伤害其实是可以避免的。

根据院方、警方和陆交局的联合文告，这显示各方必须紧密合作尽快为家长提供这方面的支持，保护孩童的安全。

竹脚妇幼医院与多家机构持续推动“竹脚妇幼医院婴儿安全座椅计划”，已成功将参与家庭的婴儿安全座椅使用率提升约35%。

另外，安全带使用率亦不理想。数据显示，在道路交通事故中，95%的10岁至16岁人士，以及超过一半的成人未系安全带，后座乘客尤为明显。统计也显示，使用安全带者的车祸死亡率为5.1%，未使用者则上升至7.8%。

在骑行安全方面，头盔使用率同样偏低，仅9.9%的儿童骑行者及28.1%的成年骑行者，在发生事故时有佩戴头盔。研究显示，佩戴头盔者死亡率为1.9%，未佩戴者则达5.3%。

竹脚妇幼医院伤害预防工作小组组长、临床助理教授陈明仁在会上分享，一名12岁男孩骑车未戴头盔，在路口遭双层巴士撞击，导致严重脑损伤。虽经手术幸存，但需长期住院与康复，因此头盔真的非常重要。

## 儿童溺水同样引关注

资料显示，从高处坠下以及溺水是另外两个导致孩童伤亡的主因。前者多发生于住宅环境，可通过安装窗户防护栏、加强看护以及教育儿童安全玩耍的重要性来加以预防。

至于降低幼童溺水风险，关键预防措施包括让孩子接受游泳训练，以及在泳池和其他如池塘及浴缸附近时要密切监督情况。竹脚妇幼医院与保健促进局合作推出了一系列关于家庭及户外的儿童水上安全信息图，并已发布在HPB家长平台（Parent Hub），同时分发至学前教育机构及住宅区等。



专家指出，安全座椅至关重要，在发生事故时能起保护作用，降低伤亡风险。（档案照）



国立大学创伤中心中心主任、客座助理教授拉吉·梅农（左）和竹脚妇幼医院伤害预防工作小组组长、临床助理教授陈明仁在大会上分享多个案例。（联合早报）

## 提出三大建议

根据文告，当前创伤预防的重点可归纳为三大方向。其中一个为长期使用安全设备，像是提高儿童安全座椅使用率、强化安全带佩戴意识，以及提高骑行头盔使用率。

第二个方向是确保公路使用者不超速，而且时刻注意路况。再来是呼吁大家不要乱过马路，而且要时时注意来往车辆。