

专家：刚打其他种类疫苗 儿童也能安全接种冠病疫苗

王懿婷 报道
gladysyt@sph.com.sg

自去年10月15日以来，本地已有超过1万名11岁及以下儿童确诊冠病，而随着社区病例增加，这个人数还将继续攀升。因此，父母应尽快让符合条件的儿童接种冠病疫苗。

另外，刚接种其他种类疫苗的儿童，也能安全接种冠病疫苗，一些国家甚至同时为儿童注射流感和冠病疫苗。

教育部连同卫生部与幼儿培育署（ECDA）前天展开一小时的免费网络研讨会，解答父母对

五岁到11岁儿童接种冠病疫苗的疑问。由于小五学生大多已在学校接种其他疫苗，上述关于儿童连续接种不同疫苗的安全性，是家长提出的其中一道问题。

卫生部医药副总监（公共卫生团）王睦贵医生解释，目前的建议是，若要连续注射超过一种疫苗，接种第一种和第二种疫苗之间最好间隔两周，主要是为了识别不同疫苗可能引发的副作用。

研讨会共收到超过900个问题，主要涵盖疫苗对儿童的安全与有效性、哪些儿童适合接种疫

苗，以及接种后的学校安排等。

国大医院邱德拔一国立大学儿童医疗中心小儿传染科主任兼高级顾问医生曾思敏说，儿童接种后出现副作用的现象比成年人少。

“每10名接种疫苗的儿童中，约六人会出现手臂酸痛；约三到四名孩子会出现一些疲惫、肌肉酸痛、头痛及发烧现象。但这些症状大多只是暂时性的，一两天后就会完全消退。”

根据目前对冠病疫苗的了解，曾思敏认为接种疫苗应不会对儿童产生任何长期副作用。

国外数据也支持儿童接种冠病疫苗的安全与效能。截至去年12月30日，美国已有超过420万名五岁至11岁儿童完成疫苗接种；注射的870万剂疫苗中，只通报11起心肌炎案例。

医生：比同龄者瘦小儿童也应注射相同剂量疫苗

美国针对2186名儿童进行的第三阶段试验发现，疫苗在避免感染冠病后出现症状方面的有效性是90.7%，这些儿童接种疫苗后也未出现严重不良反应。同样的，竹脚妇幼医院正对150名本地

儿童进行疫苗接种研究，大部分参与者已完成两剂疫苗接种，都未出现严重副作用。

也有家长问及儿童须注射的疫苗剂量。曾思敏说，即使一些儿童的体型或体重比同年龄者较为瘦小，还是应该注射相同剂量的疫苗。

“因为接种疫苗后，身体产生的免疫反应与免疫系统的成熟度有关，而个人的免疫系统成熟度是受年龄影响。”

另外，王睦贵透露，卫生部也在探讨让儿童接种辉瑞/复必泰以外的疫苗，但大多数试验仍

在初步阶段，相关数据不会在近期公布。

学校和学前教育中心目前仍未打算针对儿童实施疫苗接种差异化安全管理措施，但若学校将来要举办更多活动或可能对未接种者带来更高感染风险的活动，校方将寻找途径让未接种的学生参与。

研讨会共吸引约1300人参与，问题必须在会前提出，由教育部、卫生部、幼儿培育署和国大医院的代表回答。教育部已录下研讨会，并上载至当地的YouTube频道。